

Écureuil de Corée

Tamia rayé, Tamia strié

Nom scientifique *Tamias striatus*

Famille Sciuridae

Synonymes



Photos: wikimedia / D Swim (GNU FDL) - Dickbauch (CC3.0) - G Gonthier (CC2.0)

DESCRIPTION

Allure générale

Petit rongeur au pelage gris roussâtre avec le ventre blanc. Le motif du dos est caractéristique: une bande médiane noire et deux bandes blanches latérales bordées chacune de deux autres bandes noires. Elles se terminent par une tache rouille au niveau de la croupe. Deux lignes blanches bordent l'œil. Il pèse 80 à 140 g pour une taille de 22 à 30 cm dont 7 à 10 pour la queue. Il possède 4 doigts aux pattes antérieures et 5 doigts aux pattes postérieures. Les femelles sont plus grosses que les mâles. La queue est épaisse et longue.

Signes caractéristiques

Ne peut être confondu qu'avec *Tamias sibiricus*, espèce exotique appelée aussi Ecureuil de Corée. Si l'on attrape l'animal par la queue, cette dernière peut s'arracher du corps permettant à l'animal de s'enfuir. Il creuse un terrier dans lequel il hiberne si le climat est froid en hiver et entrepose de la nourriture. Il utilise aussi d'autres trous dans lesquels il enterre une partie de ses réserves.



ÉCOLOGIE

Alimentation : Rongeur qui se nourrit principalement de graines et de noix mais aussi de fruits et de petits animaux (mollusques, insectes, petits vertébrés, oeufs)

Reproduction : Maturité sexuelle à un an environ. Jusqu'à deux portées par an avec 3 à 5 petits en moyenne. La gestation dure une trentaine de jours et les petits sont sevrés après 4 à 5 semaines.

Habitat : Il affectionne les forêts de feuillus mais aussi les parcs et jardins urbains. Il préfère les couverts denses avec un sous bois clairsemé.

Comportement général : Animal diurne, solitaire, territorial et peu agile comparé aux écureuils arboricoles comme l'écureuil roux. Il vit principalement au sol et se réfugie dans son terrier ou dans les arbres s'il se sent menacé.

ÉTAT D'INVASION

Réunion : Une espèce proche, *Funambulus tristriatus* a été introduite vers 1855 à Saint Denis. Elle a aujourd'hui disparu. Les observations de *Tamias striatus*, probablement échappés de captivité, sont ponctuelles et l'espèce ne semble pas s'être naturalisé à l'heure actuelle.

Monde : Espèce originaire d'Amérique du Nord et très proche de *Tamias sibiricus*. Cette dernière est un animal de compagnie très prisé. Echappé de captivité, il est considéré aujourd'hui comme l'une des 100 espèces les plus envahissantes en Europe. *T. striatus*, quant à lui n'a été introduit que dans très peu de pays.

Sites à consulter:

<http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/> <http://invasives.biodiversityireland.ie>

Références: 11, 37, 22

IMPACTS

Comme beaucoup de rongeurs, les Sciuridés du genre *Tamias* sont connus pour être porteurs de maladies transmises par les rongeurs à l'homme (exemple: maladie de Lyme).

En outre l'espèce *T. sibiricus* est réputée pour avoir un impact potentiel sur les oiseaux nichant au sol.

USAGES



RÉGLEMENTATION / programme de contrôle

Les différentes espèces d'Ecureuil de Corée sont visées par l'arrêté N°05 - 1777 /SG/DRCTCV du 12 juillet 2005 interdisant certaines espèces animales exotiques dans le département de la Réunion.

Tamias striatus fait aussi partie de la liste des espèces non domestiques dont la détention ne peut être autorisée, sauf dérogation, au titre de l'arrêté du 10 août 2004 modifié.

Toutes les espèces de Sciuridés à l'exception de la Marmotte et de l'Ecureuil roux sont interdites sur le territoire métropolitain à l'introduction dans le milieu naturel au titre de l'arrêté interministériel du 30 juillet 2010.