

Oiseau Bellier

Tisserin gendarme, Bellier

Nom scientifique *Ploceus cucullatus*

Famille Ploceidae

Synonymes



Photos: Asconit (G.Moynot)

DESCRIPTION

Allure générale

Petit oiseau jaune au bec massif typique d'une alimentation granivore. Il mesure 15 à 18 cm pour un poids variant de 32 à 45 g. Le mâle en période de reproduction est à dominante jaune. La tête et le haut du dos sont noirs. Les ailes sont noires avec des liserets jaunes. L'oeil est rouge orangé. Hors période de reproduction, mâles et femelles sont vert gris avec la tête vert olive, les ailes noires et jaunes et la gorge jaune. Le ventre est parfois gris franc et uni. C'est un oiseau très bavard au chant caractéristique long et rapide. En vol il émet un "cluck" guttural.

Signes caractéristiques

La présence de cet oiseau est aisément reconnaissable par les colonies de nids tissés en fibres végétales, telles que des feuilles de bananiers, de palmes, de cannes à sucre... Situés au bout d'une tige effeuillée, ils peuvent se compter par dizaines dans un même arbre. Les nids sphériques sont composés d'une chambre de nidification et sont surmontés d'un couloir qui s'ouvre vers le bas. Les oeufs assez semblables au sein d'une même couvée, sont cependant très différents d'une couvée à l'autre. Dans son aire d'origine, il semblerait qu'il s'agisse d'une adaptation en réponse aux oiseaux parasites des nids tels que les coucous.



ÉCOLOGIE

- Alimentation :** Oiseau principalement granivore qui ne dédaigne pas les fruits, le nectar, les insectes voire des petits reptiles.
- Reproduction :** Un mâle peut construire jusqu'à cinq nids en une saison et se reproduire avec autant de femelles. Chaque femelle pond deux à trois oeufs.
- Habitat :** Espèce de milieu ouvert affectionnant les plaines, les champs cultivés et les zones urbaines. Il niche dans tout type d'arbre y compris dans les jardins et sur les bords de route.
- Comportement général :** Ce sont des oiseaux grégaires. Ils sont particulièrement bruyants lorsque des dizaines de nids sont regroupés dans un même arbre. Ils se déplacent en groupes plus ou moins nombreux y compris pour la recherche de nourriture.

ÉTAT D'INVASION

Réunion : Introduit à la Réunion vers 1880 à partir d'un bateau en provenance d'Afrique du Sud. La tradition orale veut que la première colonie se soit installée sur la propriété d'un certain Monsieur Bellier. Cette espèce anthropophile est aujourd'hui présente à proximité des activités humaines sur la majeure partie de l'île dans les zones de basse et moyenne altitude jusqu'à 1500 m, du coeur des cirques comme Cilaos jusqu'au littoral.

Monde : Oiseau originaire d'Afrique continentale, aujourd'hui présent dans les îles de l'Océan Indien, la Caraïbe ou l'Europe occidentale. Ce sont principalement des individus échappés de captivité qui sont à la source de ces introductions.

Sites à consulter:

<http://www.oiseaux-birds.com/card-village-weaver.html>

Références: 28, 29, 38

IMPACTS

Le Bellier est considéré comme un ravageur des cultures dans son aire d'origine du fait de sa prédation sur les cultures de riz, maïs et autres mils.

L'impact écologique du tisserin est peu documenté à La Réunion. On lui reproche souvent de s'attaquer aux fleurs de vanille, aux feuilles de différentes espèces de palmiers... Une observation de prédation d'un tisserin gendarme sur un gecko, probablement du genre *Hemidactylus* a été faite à La Réunion. Elle laisse envisager que cet oiseau pourrait avoir un impact sur les populations de reptiles indigènes de l'île.

USAGES



Gibier de chasse et oiseau de cage et de volière

RÉGLEMENTATION / programme de contrôle

Cette espèce est visée par l'arrêté ministériel du 25 août 2008 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée sur le territoire du département de La Réunion.